

DIFESA ANTIPARASSITARIA 2024

Bollettino n° 12 del 13 Giugno 2024

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA:

DIFESA INTEGRATA

Il monitoraggio delle popolazioni di *Scaphoideus titanus* condotto nell'ultima settimana dall'U.O. Fitosanitario Regione Veneto, conferma una densità media delle popolazioni piuttosto bassa nei vigneti difesi in modo integrato, mentre è superiore in quelli biologici, paragonabile a quella rilevata nel 2023. Per quanto riguarda la **fenologia** è convalidata l'elevata scalarità delle nascite con uno sviluppo differenziato tra le diverse zone (Vedi grafico sotto). Si segnala la presenza delle prime neanidi di 3° età e in alcuni casi delle 4° età, tuttavia, **lo stadio attuale in funzione dei diversi areali varia dalla 1° alla 2° età prevalente.**

Fenologia forme giovanili di *Scaphoideus titanus* al 11 giugno 2024




Grafico fenologia - U.O. Fitosanitario Regione Veneto

Premesso questo, la finestra di intervento per il **1° trattamento obbligatorio**, prevista dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto, nei **vigneti difesi in modo integrato**, ove sono obbligatori due interventi, indica come date **dal 14 al 22 di giugno**.

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00

Consorzio Tutela Vini Soave
Vicolo Mattielli, 11 37038 – Soave (VR)
Tel. +39 045 7681578 / Fax. +39 045 6190306
consorzio@ilsoave.com

I prodotti ammessi, e riportati nelle **linee tecniche di difesa integrata 2024** sono i seguenti:

	Difesa integrata (obbligatoria e volontaria)	Difesa biologica Reg (UE) 2018/848
1°int	Acetamiprid, Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Flupyradifurone, Lambda-cialotrina, Sulfoxaflor o Tau-fluvalinate	Azadiractina, Beauveria bassiana, Olio di arancio dolce, Piretrine o Sali potassici di acidi grassi. Oppure Caolino (sostanza corroborante)
2°int	Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Lambda-cialotrina o Tau-fluvalinate	Piretrine
3°int	-----	Piretrine

Si ricorda inoltre che, per ottenere i migliori risultati dall'intervento insetticida è opportuno:

1. **Bagnare adeguatamente la vegetazione**, interessando tutta la chioma **ed eventuali polloni presenti sul fusto e giovani viti**, quindi **evitare i bassi volumi** (almeno 600 lt/ha) ed acidificare la soluzione a pH 6-6,5 con l'aggiunta di adesivanti ed intervenendo nelle ore più fresche della giornata.
2. Eseguire tutte le **operazioni agronomiche** volte a migliorare l'efficacia del trattamento, quali: **cimature** e **defogliazioni**, **almeno due giorni prima dell'intervento**, in modo che il prodotto insetticida arrivi e permanga il più possibile su tutta la chioma della pianta.
3. **Eseguire lo sfalcio del cotico erboso in fioritura almeno due giorni prima del trattamento.**
4. **Evitare di intervenire poco dopo l'evento piovoso e attendere almeno 48 h.**

Prestare molta attenzione ad intervenire da fine fioritura.

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00

Consorzio Tutela Vini Soave
Vicolo Mattielli, 11 37038 – Soave (VR)
Tel. +39 045 7681578 / Fax. +39 045 6190306
consorzio@ilsoave.com