



MODELLO DI GESTIONE VITICOLA AVANZATA **DEL SOAVE E DEI TERRITORI LIMITROFI**





DIFESA ANTIPARASSITARIA 2024

Bollettino del 6 Agosto 2024 N°18















,Mantenere adeguata *VITIGNI* INTERESSATI: TUTTI una Zolfo, della Vegetazione Rameici copertura con

e per TIGNOLETTA III° GENERAZIONE:

Prestare massima ATTENZIONE ai tempi di carenza dei diversi formulati commerciali! (NB: L'inizio della raccolta per le varietà precoci è ipotizzata nell'ultima decade di Agosto) Tenendo conto che la terza generazione ha in genere uno sviluppo scalare nel tempo, si può ipotizzare di posizionare i diversi insetticidi come segue:

Sostanza Attiva	Intervallo di sicurezza	Momento di applicazione		Periodo consigliato	
				pianura,	Collina e
				fondovalle	alta collina
Tebufenozide	30 gg Solo su varietà TARDIVE			06-09 agosto	09-11 agosto
Bacillus thuringensis 1° tratt	-				
Emamectina b.	7 gg	uova		07-12	10-16
***************************************	Max 2 Tratta. Annui	testa nera		agosto	agosto
SPINETORAM	7 gg. Max 1 Intervento				
Bacillus thuringensis 2° tratt	_	larve		12-18 agosto	15-21 agosto

- BOTRITE: PER TUTTE LE VARIETA', si consiglia di utilizzare prodotti ANTIBOTRITICI biologici e terpeni,

Prestare massima attenzione all'andamento meteo, evitare di trattare prima di eventuali piogge per limitare il dilavamento dell'Insetticida e Antibotritico

> SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578 DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00